



---

**Original Article: ANALISI CAUSE DI RICERCA E FATTORI DELLA MALATTIA PERITONITE**

**Citation**

Dyabkin E.V. Analisi cause di ricerca e fattori della malattia peritonite. *Italian Science Review*. 2016; 8(41). PP. 1-4.

Available at URL: <http://www.ias-journal.org/archive/2016/september/Dyabkin.pdf>

**Authors**

E.V. Dyabkin, Krasnoyarsk State Medical University, Russia.

Submitted: August 23, 2016; Accepted: September 12, 2016; Published: September 19, 2016

**Astratta**

In studi sulle cause e l'eziologia della malattia peritonite, si è constatato che gli uomini più frequentemente colpite da questa complicazione (58%), il picco di incidenza è stato osservato nel 2010 (40% del numero totale dei pazienti), l'età principale gamme insorgenza da 19 a 36 anni (46 %). La complicanza più comune è la peritonite, ascesso appendicite (57%).

Parole chiave: eziologia, l'analisi strutturale, peritonite, ascesso appendicite incidenza.

**Introduzione**

Il trattamento delle malattie infiammatorie della chirurgia addominale rimane un problema urgente, e soprattutto la chirurgia di condizioni di emergenza. Nonostante i miglioramenti nelle tecniche diagnostiche e l'introduzione di diversi nuovi metodi di terapia intensiva, la mortalità tra i pazienti con peritonite rimane alto [1]. Secondo i dati attuali in letteratura, con diffusa purulenta peritonite oscilla ampiamente da 9,79% al 84% e una media di 38,6% -45%, che presenta ancora la mancanza di un unico approccio integrato efficace per il trattamento [2].

Il progressivo sviluppo del processo suppurativa in una cavità addominale anatomicamente complesso chiuso, la rapida crescita di intossicazione e le

conseguenti gravi violazioni del emodinamico e respiratorio metabolismo drasticamente ridotta, complica il trattamento di purulenta peritonite. Di qui gli alti tassi di mortalità [3].

Obiettivo: studiare l'incidenza di peritonite eziologia secondo un'analisi retrospettiva di 100 casi clinici di pazienti con diagnosi di peritonite, trattati al primo reparto di chirurgia della Strada Hospital Clinico Art. Krasnoyarsk per il periodo 2009-2012.

**Materiali e metodi**

Lo studio ha condotto una revisione retrospettiva di 100 casi clinici di pazienti con peritonite che si trovano nel primo reparto di chirurgia dell'ospedale ferroviaria clinica nel periodo dal 2009 al 2012, come un'analisi comparativa dei dati è stata effettuata.

Nel descrivere i gruppi di analisi della distribuzione delle specie sono stati valutati per la distribuzione normale con il metodo di Shapiro-Wilks. In caso di distribuzione normale e l'uguaglianza della varianza confermano la determinazione della significatività statistica delle differenze è stata eseguita con il test t di Student. Le differenze sono state considerate statisticamente significative con  $p < 0,05$ .

**Risultati e discussione**

Il numero totale di pazienti con diagnosi di peritonite, ricevuto dal Hospital Road clinica nel periodo 2009-2012. E' pari a 100 persone. Il maggior numero di pazienti registrati nel 2010 e pari al 40% del totale ricevuto, il più basso - nel 2011 (13%) (Tabella 1).

La distribuzione dei pazienti per sesso ha rivelato che le donne costituiscono da 42% di sesso maschile - 58% (Tabella 2).

L'età dei pazienti variava da una peritonite 18 a 73 anni. Si è trovato che il maggior numero di pazienti di età compresa tra 19 a 36 anni, che è 46%, mentre a 67 anni e 72 anni rappresentano il numero minimo di pazienti tra - 8% (tabella 3).

Sulla base delle analisi ha rilevato che la causa più comune di peritonite è acuta appendicite ascesso - 57% meno probabilità peritonite sviluppa nel ernia inguinale strozzata - 1% (Tabella 4).

Il processo più comune per la prevalenza di peritonite era locale - 71% dei casi, e dalla natura del fluido - sierosa (62%).

tempestivo arrivo del paziente in ospedale è un fattore essenziale per il successo del trattamento e una prospettiva positiva in futuro. Si è constatato che il numero massimo di pazienti in ospedale ricevuto nel periodo di tempo di 6-24 ore dopo l'insorgenza di peritonite (44%) nel periodo fino a 6 ore dall'insorgenza - 28%, più di 24 ore - e 28%.

I seguenti sono state riscontrate differenze malattie stagionali. Vi è un'alta incidenza di peritonite in estate (40%) nella valutazione dei dati immediati dei pazienti dal 2009 al 2012, mentre nel 2010

l'incidenza ha raggiunto il picco in autunno - il 24% del numero totale di pazienti con peritonite.

Durante il periodo di studio, il numero totale di decessi di pazienti con diagnosi di peritonite - 20 persone: nel 2009 - 3 persone, nel 2010 - 13 nel 2011 - 1, in 2012 - 3 persone. La mortalità postoperatoria dalla malattia pari al 20% del numero totale di pazienti.

#### Conclusioni

Così, le seguenti conclusioni si possono trarre dai dati:

1. Nel corso dello studio ha trovato che il picco di incidenza di peritonite avvenuta nel 2010 e pari al 40% del numero totale di pazienti con peritonite.

2. Secondo il primo reparto di chirurgia dell'ospedale ferroviaria clinico per impianto Krasnoyarsk peritonite più comunemente colpiti maschi (58%), il numero massimo di casi (46%) di età compresa tra i 19 e 36 anni tra.

3. La causa primaria di peritonite è appendicite flemmonosa (57%), nella maggior parte dei casi è stata peritonite locale (71%).

#### References:

1. Butrov A.V., Shestopalov A.E. 2004. The regular editions of "breast cancer», 8. p.561.
2. Davydov Yu.A., Larichev A.B., A.V. Volkov. 2000. The total purulent peritonitis. p.120.
3. Kosinets V.A. Sachek M.G., Kondratenko G.G. 2010. Surgery, 1. pp. 59-63.

Tabella 1

Distribuzione dei pazienti secondo l'anno di ammissione

anno	malato	
	assoluto	%
2009	22	22
2010	40	40
2011	13	13
2012	25	25
<b>solo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabella 2

La distribuzione dei pazienti per sesso

Genere	malato	
	assoluto	%
maschi	58	58
donne	42	42
solo	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabella 3

La distribuzione dei pazienti per età

la fascia di età	malato	
	assoluto	%
Fino a 18 anni	9	9
Da 19 a 36 anni	46	46
Da 37 a 54 anni	8	8
Da 55 a 66 anni	16	16
Da 67 a 72 anni	8	8
Di 73 anni e più	13	13
solo	<b>100</b>	<b>100</b>

Tabella 4

## Distribuzione dei pazienti in base eziologico

la causa di peritonite	numero	
	assoluto	%
Acuta ascesso Appendicite	53	53
Acuta appendicite catarrale	6	6
Acuta appendicite gangrenosa	3	3
coelitiasi	8	8
L'ulcera dello stomaco e del duodeno	8	8
colecistite acuta	5	5
La pancreatite acuta	4	4
ileo	7	7
pancreatonecrosis	1	1
Ernia inguinale strozzata	1	1
Acqua esaurimento trombosi mesenterica	4	4
solo	<b>100</b>	<b>100</b>